

# Zusammenfassung AN2I

## 1 CONTENTS

---

|       |                                                          |    |
|-------|----------------------------------------------------------|----|
| 2     | Taylorreihen.....                                        | 2  |
| 2.1   | Taylorpolynom .....                                      | 2  |
| 2.2   | Fehlerabschätzung .....                                  | 3  |
| 2.3   | Linearisierung um $x_0$ mit maximalem Rechenfehler ..... | 4  |
| 3     | Grenzwerte .....                                         | 5  |
| 3.1   | Im Unendlichen.....                                      | 5  |
| 3.2   | Im Endlichen .....                                       | 5  |
| 3.3   | Einseitige Grenzwerte .....                              | 6  |
| 3.4   | Rechenregeln .....                                       | 7  |
| 3.5   | Regel von Bernoulli und Hopital.....                     | 7  |
| 4     | Lineare Regression .....                                 | 8  |
| 4.1   | Grad 1 (würde aber auch für höhere Grade gehen).....     | 8  |
| 4.2   | Gleiches Ergebnis mit Formel aus Formelsammlung.....     | 9  |
| 4.3   | Passenden Grad der Modellfunktion .....                  | 10 |
| 5     | Integrieren .....                                        | 11 |
| 5.1   | Unbestimmte Integrale .....                              | 11 |
| 5.1.1 | Substitutionsregel .....                                 | 12 |
| 5.2   | Bestimmte Integrale .....                                | 12 |
| 5.2.1 | Partielle Integration .....                              | 13 |
| 5.2.2 | Als Fläche .....                                         | 13 |
| 6     | Fourierreihen .....                                      | 14 |
| 6.1   | Beispiel.....                                            | 16 |
| 6.2   | Satz von Dirichlet .....                                 | 17 |
| 6.3   | Amplituden-Phasen-Form .....                             | 17 |

## 2 TAYLORREIHEN

### 2.1 TAYLORPOLYNOM

Gegeben: Funktion  $f(x)$ , Ordnung  $N$ , Entwicklungszentrum  $x_0$

1. Ableitungen von  $f(x)$  bis  $N$  berechnen

$$f(x) = \sin(2x), \quad N=6, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$f^{(1)}(x) = 2\cos(2x)$$

$$f^{(2)}(x) = -4\sin(2x)$$

$$f^{(3)}(x) = -8\cos(2x)$$

$$f^{(4)}(x) = 16\sin(2x)$$

$$f^{(5)}(x) = 32\cos(2x)$$

$$f^{(6)}(x) = -64\sin(2x)$$

$$f^{(1)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\cos(\pi) = -2$$

$$f^{(2)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -4\sin(\pi) = 0$$

$$f^{(3)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -8\cos(\pi) = 8$$

$$f^{(4)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 16\sin(\pi) = 0$$

$$f^{(5)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 32\cos(\pi) = -32$$

$$f^{(6)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -64\sin(\pi) = 0$$

2. Mit Formel aus Formelsammlung zusammensetzen

$$f_6(x) = \frac{\sin(\pi)}{1} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^0 + \frac{-2}{1} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^1 + \frac{8}{6} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^3 + \frac{-32}{120} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^5 -$$
$$\underline{\underline{-2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{4}{3}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^3 - \frac{4}{15}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^5}}$$

## 2.2 FEHLERABSCHÄTZUNG

Gegeben: Funktion  $f(x)$ , Ordnung  $N$ , Intervall  $[a; b]$

Je grösser  $N$ , desto kleiner ist der Fehler

1. Ableitung  $N + 1$  berechnen

$$f(x) = \sin(2x), \quad N=6, \quad [0; \pi]$$

$$f^{(7)}(x) = -128 \cos(2x)$$

2.  $m$  berechnen/abschätzen

$$f^{(7)}(0) = -128 \cos(0) = -128$$

$$f^{(7)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -128 \cos(\pi) = 128$$

$$f^{(7)}(\pi) = -128 \cos(2\pi) = -128$$

$$m \geq |f^{(7)}(x)| \quad (FS)$$

Wir wählen daher  $m = 128$

3. Maximalen Fehler berechnen

$$\frac{m(b-a)^{N+1}}{2^{N+1}(N+1)!} \quad (FS) =$$

$$\frac{128(\pi-0)^7}{2^7 \cdot 7!} = \frac{2^7 \cdot \pi^7}{2^7 \cdot 7!} = \underline{\underline{\frac{\pi^7}{7!}}}$$

Mit dieser Methode kann auch der minimale Grad berechnet werden, indem man  $m$  bestimmt und dann mit verschiedenen  $N$  ausprobiert, bis der Fehler berechnet werden kann.

### 2.3 LINEARISIERUNG UM $x_0$ MIT MAXIMALEM RECHENFEHLER

Gegeben: Funktion  $f(x)$ , Entwicklungspunkt  $x_0$ , maximaler Rechenfehler  $\Delta$

Gesucht: Intervall  $[a; b]$

$$f(x) = e^{\sin(x)}, \quad x_0 = 0, \quad \Delta = 0,05$$

1. Zweimal ableiten

$$f'(x) = e^{\sin(x)} \cdot \cos(x)$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= e^{\sin(x)} \cdot \cos(x) \cdot \cos(x) + e^{\sin(x)} \cdot (-\sin(x)) \\ &= e^{\sin(x)} \cdot (\cos^2(x) - \sin(x)) \end{aligned}$$

2. Linearisieren

$$L(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

$$f'(x_0) = e^{\sin(0)} \cdot \cos(0) = e^0 \cdot 1 = 1$$

$$f(x_0) = e^{\sin(0)} = 1$$

$$L(x) = 1 \cdot (x - 0) + 1 = x + 1$$

3. M bestimmen

$$|f''(x_0)| \leq m \quad (\text{FS})$$

$$f''(x_0) = e^{\sin(0)} \cdot (\cos^2(0) - \sin(0)) = e^0 (1 - 0) = 1$$

$$1 \leq m \rightarrow \text{z.B. } m = 2$$

4. Intervall berechnen

$$\left[ x_0 - \sqrt{\frac{2\Delta}{m}}; x_0 + \sqrt{\frac{2\Delta}{m}} \right] = \left[ -\sqrt{\frac{0,1}{2}}; \sqrt{\frac{0,1}{2}} \right] = \left[ -\sqrt{\frac{1}{20}}; \sqrt{\frac{1}{20}} \right]$$

5. Kontrolle, ob Funktion bei Maximalwert noch kleiner als m ist

$$|f''(x)| \leq m \quad (\text{FS})$$

$$f''\left(\sqrt{\frac{1}{20}}\right) = e^{\sin\left(\sqrt{\frac{1}{20}}\right)} \cdot (\cos^2\left(\sqrt{\frac{1}{20}}\right) - \sin\left(\sqrt{\frac{1}{20}}\right)) \approx e^{0,1} \cdot$$

$$(0,8 - 0,1) = 0,5 \cdot 0,7 \approx 0,35 \quad \underline{\underline{\text{ok} \leq 2}}$$

### 3 GRENZWERTE

Mit dem Limes bezeichnet man, was passiert, wenn der Parameter der Funktion gegen  $\infty$ ,  $-\infty$  oder eine Zahl geht.

Wenn nach dem Limes an einer unstetigen Stelle gefragt wird, existiert er nicht. Er kann jedoch mit der stetigen Fortsetzung bestimmt werden, wenn dies möglich ist.

#### 3.1 IM UNENDLICHEN

a)  $f(x) = x^2$  :  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \infty$

b)  $f(x) = x^3$  :  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = \infty$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$

c)  $f(x) = \frac{1}{x}$  :  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$


d)  $f(x) = \frac{1'000'000}{x}$  :  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1'000'000}{x} = 0$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1'000'000}{x} = 0$

e)  $f(x) = \cos(x)$  :  $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos(x)$  existiert nicht  
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(x)$  existiert nicht

f)  $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$  :  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$

g)  $f(x) = \arctan(x)$  :  $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$

h)  $f(x) = \frac{4x^3 - 10x}{2x^3 + 3x^2}$  :  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 10x}{2x^3 + 3x^2} \cdot \frac{\frac{1}{x^3}}{\frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{10}{x^2}}{2 + \frac{3}{x}} = \frac{4-0}{2+0} = 2$   
 Analog:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$



#### 3.2 IM ENDLICHEN

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3}{x + 1} = \frac{2^2 - 3}{2 + 1} = \frac{1}{3}$

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 3}{x + 1}$  existiert nicht

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x-1) = -2$

e)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( e^x \cdot \frac{x^4 + 3x}{x^3 - 1} \right) = \left( \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \right) \cdot \left( \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 3x}{x^3 - 1} \right)$   
 $= \infty \cdot \infty = \infty$

f)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left( \frac{1}{x} \cdot e^{\frac{x-1}{x}} \right) = \left( \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \right) \cdot \left( \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{x-1}{x}} \right)$   
 $= -\infty \cdot \infty = -\infty$

Bsp  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$   $\infty - \infty$

Trick: Erweitern  

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 4x} - x) \cdot (\sqrt{x^2 + 4x} + x)}{\sqrt{x^2 + 4x} + x}$$

3. Bin. Formel  

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x - x^2}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{\frac{1}{x} \sqrt{x^2 + 4x} + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{x}} + 1} = \frac{4}{2} = \underline{\underline{2}}$$

$\downarrow \frac{1}{x^2}$        $\downarrow 0$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \quad \frac{0}{0}$

Taylorreihe von  $\cos(x)$  um  $x_0 = 0$


$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \dots\right)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2!} x^2 - \frac{1}{4!} x^4 + \dots}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} \underbrace{x^2}_0 + \frac{1}{6!} \underbrace{x^6}_0 - \dots \right) = \frac{1}{2!} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

### 3.3 EINSEITIGE GRENZWERTE

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  existiert nicht



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = \infty$$

(rechtsseitiger Grenzwert)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

(linksseitiger Grenzwert)

### 3.4 RECHENREGELN

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow q} (c \cdot f(x)) &= c \cdot \lim_{x \rightarrow q} f(x), \text{ für } c \in \mathbb{R} \\ \lim_{x \rightarrow q} (f(x) + g(x)) &= \lim_{x \rightarrow q} f(x) + \lim_{x \rightarrow q} g(x) \\ \lim_{x \rightarrow q} (f(x) \cdot g(x)) &= \lim_{x \rightarrow q} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow q} g(x) \\ \lim_{x \rightarrow q} \left( \frac{f(x)}{g(x)} \right) &= \frac{\lim_{x \rightarrow q} f(x)}{\lim_{x \rightarrow q} g(x)}, \text{ falls } \lim_{x \rightarrow q} g(x) \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow q} (f(x)^{g(x)}) &= \left( \lim_{x \rightarrow q} f(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow q} g(x)}, \text{ falls } \lim_{x \rightarrow q} f(x) > 0\end{aligned}$$

### 3.5 REGEL VON BERNOULLI UND HOPITAL

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

falls Typ  $\frac{0}{0}$  oder  $\frac{\infty}{\pm\infty}$ , und Grenzwert auf rechter Seite existiert.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\infty \cdot 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x^{-1/2}} \quad \frac{0}{0}$$

↪ Bernoulli, l'Hospital

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx} \left( \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right)}{\frac{d}{dx} \left( x^{-1/2} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{2} \cdot x^{-3/2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot x^{3/2}}{\frac{1}{2} \cdot x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{2} \sqrt{x}} = \frac{1}{\infty} = \underline{\underline{0}}$$

## 4 LINEARE REGRESSION

Gegeben: Wertetabelle mit x/y Daten oder Graph

Gesucht: Modellfunktion, das ist ein Polynom eines gewissen Grades, das den ursprünglichen Graphen möglich gut repräsentiert, also der Gesamtfehler möglichst klein ist

Wenn es eine vertikale Linie (Grad  $N=0$ ) werden soll, ist es einfach der Durchschnitt der y-Werte

### 4.1 GRAD 1 (WÜRD ABER AUCH FÜR HÖHERE GRADE GEHEN)

Gegeben:

|       |    |    |     |
|-------|----|----|-----|
| $x_i$ | 0  | 3  | 5   |
| $y_i$ | 80 | 90 | 105 |

Gesucht: Funktion in der Form  $f(x) = m \cdot x + b$ , bzw.  $f(x) = \lambda_0 \cdot 1 + \lambda_1 \cdot x$

1. Gleichung zum Gesamtfehler aufstellen

$$\begin{aligned} RSS &= \sum_{i=0}^{n-1} (f(x_i) - y_i)^2 \\ &= (m \cdot 0 + b - 80)^2 + (m \cdot 3 + b - 90)^2 + (m \cdot 5 + b - 105)^2 \\ &= (b - 80)^2 + (3m + b - 90)^2 + (5m + b - 105)^2 \end{aligned}$$

2. Nach m ableiten

$$\begin{aligned} &2(b - 80) \cdot 0 + 2(3m + b - 90) \cdot 3 + 2(5m + b - 105) \cdot 5 = \\ &6(3m + b - 90) + 10(5m + b - 105) = \\ &18m + 6b - 540 + 50m + 10b - 1050 = \\ &68m + 16b - 1590 = 0 \rightarrow 34m + 8b - 795 = 0 \end{aligned}$$

3. Nach b ableiten

$$\begin{aligned} &2(b - 80) \cdot 1 + 2(3m + b - 90) \cdot 1 + 2(5m + b - 105) \cdot 1 = \\ &2b - 160 + 6m + 2b - 180 + 10m + 2b - 210 = \\ &16m + 6b - 550 = 0 \rightarrow 8m + 3b - 275 = 0 \end{aligned}$$

4. Gleichungssystem lösen

$$\begin{array}{l|l} 34m + 8b - 795 = 0 & \cdot 3 \\ + 8m + 3b - 275 = 0 & \cdot (-8) \\ \hline 38m - 185 = 0 & \\ m = \frac{185}{38} & \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} b = \frac{275 - 8m}{3} = \frac{275 - 8 \left( \frac{185}{38} \right)}{3} = \frac{1495}{19} \\ \hline \hline f(x) = \frac{185}{38} x + \frac{1495}{19} \end{array} \right.$$

## 4.2 GLEICHES ERGEBNIS MIT FORMEL AUS FORMELSAMMLUNG

|       |    |    |     |
|-------|----|----|-----|
| $x_i$ | 0  | 3  | 5   |
| $y_i$ | 80 | 90 | 105 |

Gegeben:

Gesucht: Funktion in der Form  $f(x) = m \cdot x + b$ , bzw.  $f(x) = \lambda_0 \cdot 1 + \lambda_1 \cdot x$

1. Designmatrix B definieren

| $x_i$ | $b_0 = 1$ | $b_1 = x$ | $y_i$ |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 0     | 1         | 0         | 80    |
| 3     | 1         | 3         | 90    |
| 5     | 1         | 5         | 105   |

 $\rightarrow B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$

2. Gleichung aus Formelsammlung anwenden

$$B^T \cdot B \cdot \vec{\lambda} = B^T \cdot \vec{y}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 80 \\ 90 \\ 105 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 5 \\ 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 80 + 1 \cdot 90 + 1 \cdot 105 \\ 0 \cdot 80 + 3 \cdot 90 + 5 \cdot 105 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 8 & 34 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 275 \\ 795 \end{pmatrix}$$

$$\left( \begin{array}{cc|c} 3 & 8 & 275 \\ 8 & 34 & 795 \end{array} \right) \cdot 8$$

$$\left( \begin{array}{cc|c} 24 & 64 & 2200 \\ 24 & 102 & 2385 \end{array} \right) - 2_1$$

$$\left( \begin{array}{cc|c} 24 & 64 & 2200 \\ 0 & 38 & 185 \end{array} \right)$$

$$\lambda_1 = \frac{185}{38}$$


$$24\lambda_0 + 64\lambda_1 = 2200 \quad | :8$$

$$3\lambda_0 + 8\lambda_1 = 275$$


$$\lambda_0 = \frac{275 - 8\lambda_1}{3} = \frac{1495}{19}$$

$$\underline{\underline{f(x) = \frac{185}{38}x + \frac{1495}{19}}}$$


### 4.3 PASSENDEN GRAD DER MODELLFUNKTION



"Underfitting"  
zu wenige Konfigurations-  
parameter



Sinnvoll,  
Vorhersage/Generalisierung  
möglich



"Overfitting"  
Daten werden auswendig gelernt,  
keine Vorhersage möglich.

Definitiv overfitted, wenn der Grad gleich gross ist wie die Anzahl Datenpunkte

Definitiv underfitted, wenn z.B. bei etwa quadratischer Funktion der Grad=0 gewählt wird

## 5 INTEGRIEREN

Eine Funktion  $F(x)$ , deren Ableitung gleich  $f(x)$  ist, heisst Stammfunktion von  $f$ .

$$f(x) = x^7, \quad F(x) = \frac{1}{8} x^8$$

$$g(x) = e^x, \quad G(x) = e^x$$

$$h(x) = \sin(x), \quad H(x) = -\cos(x)$$

$$a(x) = \frac{1}{x}, \quad A(x) = \ln(|x|)$$

$$b(t) = 3 \cos(t) - 2, \quad B(t) = 3 \sin(t) - 2t$$

$$f(t) = 7ax + 2t, \quad F(t) = 7axt + t^2$$

$$g(x) = e^{2x}, \quad G(x) = \frac{1}{2} e^{2x}$$

### 5.1 UNBESTIMMTE INTEGRALE

Es gibt immer unendliche viele unbestimmte Integrale (Stammfunktionen) einer Funktion, weil alle möglichen Konstanten der Stammfunktion angehängt sein können, jedoch zu 0 abgeleitet werden. Man kann alle mit «+c» zusammenfassen.

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

= Menge aller Stammfunktionen

$$= \{F(x) + c \mid c \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{F(x) \mid F'(x) = f(x)\}$$

$$\int 6x dx = 3x^2 + c$$

$$\int (3x^2 + 1) dx = x^3 + x + c$$

$$\int (e^x - \sin(x)) dx = e^x + \cos(x) + c$$

$$\int \frac{1}{2x} dx = \frac{1}{2} \ln(|x|) + c = \frac{1}{2} \ln(|2x|) + c$$

$$\int \cos(5t) \cdot 5 dt = \sin(5t) + c$$

$$\int \cos(x^2 + 3x) \cdot (2x + 3) dx = \sin(x^2 + 3x) + c$$

Linearitätsregel:

$$\int (\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x)) dx = \alpha \cdot \int f(x) dx + \beta \cdot \int g(x) dx$$

### 5.1.1 Substitutionsregel

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + c$$

Spezialfälle der Substitutionsregel:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) dx = \ln(|f(x)|) + c$$

$$\int f(x)^n \cdot f'(x) dx = \frac{1}{n+1} \cdot f(x)^{n+1} + c$$

#### 5.1.1.1 Partielle Integration

$$\begin{aligned} \int \cos(x) \cdot x dx &= \sin(x) \cdot x - \int \sin(x) \cdot 1 dx \\ &= \sin(x) \cdot x - \int \sin(x) dx \\ &= \sin(x) \cdot x - (-\cos(x)) + c \\ &= \sin(x) \cdot x + \cos(x) + c \end{aligned}$$

Faustregeln:

- $\ln(x)$  immer Ableiten
- $x$ , Polynome ableiten, ausser es kommt ein  $\ln(x)$  vor
- $e^x, \cos(x), \sin(x)$  egal, ob ableiten oder integrieren

### 5.2 BESTIMMTE INTEGRALE

obere  $\rightarrow b$   
Integrationsgrenze

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

untere  $\rightarrow a$   
Integrationsgrenze

Integrand

$$\left[ F(x) \right]_{x=a}^b$$


$$\frac{d}{dx} \left( \int_{-7}^x (\cos(3t) - \sqrt{5t+1}) dt \right) = \cos(3x) - \sqrt{5x+1}$$

Integralfunktion


### 5.2.1 Partielle Integration

$$\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = \left[ F(x) \cdot g(x) \right]_a^b - \int_a^b F(x) \cdot g'(x) dx$$

### 5.2.2 Als Fläche



$$A = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$



a)  $A = 4.5 = \frac{9}{2}$  (eingefärbte Fläche)

b)  $\int_{-3}^2 f(x) dx = -3 + 1.5 = -1.5 = -\frac{3}{2}$

c)  $\int_{-3}^2 |f(x)| dx = \frac{9}{2}$

Knick (nicht differenzierbar bei  $x=1$ )

$F(x) = \int_{-3}^x f(t) dt$  ist eine Stammfunktion von  $f(x)$

$$F(-3) = \int_{-3}^{-3} f(t) dt = 0$$

$$F(-2) = \int_{-3}^{-2} f(t) dt = \int_{-3}^{-2} (-2) dt = [-2t]_{-3}^{-2} = 4 - 6 = -2$$

$$F(-1) = \int_{-3}^{-1} f(t) dt = -3$$

$$F(0) = -3 + \frac{1}{4} = -2.75$$

$$F(1) = -2$$

$$F(2) = -1.5 = -\frac{3}{2}$$

Graph von  $f(x)$  wird

- um 3 nach rechts verschoben  $\leadsto g(x) = f(x-3)$
- um 7 nach links verschoben  $\leadsto g(x) = f(x+7)$
- um 4 nach oben verschoben  $\leadsto g(x) = f(x) + 4$
- um Faktor 5 in y-Richtung gestreckt  $\leadsto g(x) = 5 \cdot f(x)$
- um Faktor 2 in x-Richtung gestreckt  $\leadsto g(x) = f\left(\frac{1}{2}x\right) = f\left(\frac{x}{2}\right)$



## 6 FOURIERREIHEN

Eine Funktion  $f$  heisst periodisch, wenn es eine Zahl  $T > 0$  gibt, so dass  $f(x+T) = f(x)$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ .  
Die Zahl  $T$  heisst Periode von  $f$ .

Die kleinste Zahl  $T$  mit  $f(x+T) = f(x)$  für alle  $x \in \mathbb{R}$  heisst primitive Periode.

Grundkreisfrequenz  $\omega = \frac{2\pi}{T}$ , primitive Periode:  $T = \frac{2\pi}{\omega}$

- $\cos(5x)$   $T = \frac{2\pi}{5}$ ,  $\omega = \frac{2\pi}{T} = 5$
- $\sin(2t) - \frac{1}{3} \cdot \cos(2t)$   $T = \pi$ ,  $\omega = 2$
- $\cos(2t) + \sin(4t)$   $T = \pi$ ,  $\omega = 2$   
 $\pi, 2\pi, 3\pi, \dots$   $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, \dots$
- $7 \cdot \sin(4t) + 2 \cdot \cos(6t)$   $T = \pi$ ,  $\omega = 2$   
 $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, \dots$   $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \dots$
- $\sin(1.3t) + 2$   $T = \frac{2\pi}{1.3}$ ,  $\omega = 1.3$

|                | gerade Funktionen                                                                                                                                            | ungerade Funktionen                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definition     | $f(-x) = f(x)$                                                                                                                                               | $f(-x) = -f(x)$                                                                                                                                              |
| graphisch      | Graph ist achsensymm. zur y-Achse                                                                                                                            | Graph ist punktsymm. zum Ursprung                                                                                                                            |
| Beispiele      | $f(x) = \cos(x)$<br>$f(x) = x^4, f(x) = \frac{1}{x^4}$<br>$f(x) = x^4 \cdot \cos(x)$<br>$f(x) = x^5 \cdot \sin(x)$<br>gerade · gerade<br>ungerade · ungerade | $f(x) = \sin(x)$<br>$f(x) = x^5, f(x) = \frac{1}{x^5}$<br>$f(x) = x^4 \cdot \sin(x)$<br>$f(x) = x^5 \cdot \cos(x)$<br>gerade · ungerade<br>ungerade · gerade |
| Integral-Trick | $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$<br>                      | $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$<br>                                             |


$$f \text{ gerade} \Rightarrow b_k = 0$$

$$f \text{ ungerade} \Rightarrow a_k = 0$$

## 6.1 BEISPIEL

Aufgabe (Bitte dokumentieren Sie Ihre Überlegungen auf einem separaten Blatt):

Die Funktion  $g(t)$  sei durch den folgenden Funktionsgraphen gegeben:



(a) Welche Periode hat die Funktion  $g(t)$ ?

(b) Bestimmen Sie die Fourierreihe der Ordnung 4 des Signals in der Sinus-Kosinus-Form.

$$a) \quad T = 4, \quad \omega = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$b) \text{ ungerade} \rightarrow a_0 = a_k = 0$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cdot \sin(k\omega t) dt = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cdot \sin(k\omega t) dt = \frac{4}{4} \int_0^{4/2} f(t) \cdot \sin(k \cdot \frac{\pi}{2} \cdot t) dt$$

$$= \int_0^1 t \cdot \sin(k \cdot \frac{\pi}{2} \cdot t) dt + \int_1^2 0 \cdot \sin(k \cdot \frac{\pi}{2} \cdot t) dt = \int_0^1 t \cdot \sin(k \cdot \frac{\pi}{2} \cdot t) dt =$$

$$\left[ \frac{-2}{k \cdot \pi} \cdot \cos(k \cdot \frac{\pi}{2} \cdot t) \cdot t \right]_{t=0}^1 - \int_0^1 \frac{-2}{k \cdot \pi} \cdot \cos(k \cdot \frac{\pi}{2} \cdot t) \cdot 1 dt =$$

$$\left( \frac{-2}{k \cdot \pi} \cdot \cos(k \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 1) \right) - \left[ \frac{-4}{k^2 \pi^2} \cdot \sin(k \cdot \frac{\pi}{2} \cdot t) \right]_{t=0}^1 =$$

$$\frac{-2 \cdot \cos(\frac{k \cdot \pi}{2})}{k \cdot \pi} - \left( \frac{-4}{k^2 \pi^2} \cdot \sin(k \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 1) \right) =$$

$$\frac{4 \sin(\frac{k \cdot \pi}{2})}{k^2 \pi^2} - \frac{2 \cos(\frac{k \cdot \pi}{2})}{k \pi}$$

$$b_1 = \frac{4 \sin(\frac{\pi}{2})}{1^2 \pi^2} - \frac{2 \cos(\frac{\pi}{2})}{1 \pi} = \frac{4}{\pi^2}$$

$$b_2 = \frac{4 \sin(\pi)}{4 \pi^2} - \frac{2 \cos(\pi)}{2 \pi} = \frac{1}{\pi}$$

$$b_3 = \frac{4 \sin(\frac{3\pi}{2})}{9 \pi^2} - \frac{2 \cos(\frac{3\pi}{2})}{3 \pi} = \frac{-4}{9 \pi^2}$$

$$b_4 = \frac{4 \sin(2\pi)}{16 \pi^2} - \frac{2 \cos(2\pi)}{4 \pi} = \frac{-2}{4 \pi} = -\frac{1}{2\pi}$$

$$S_4(t) = \frac{4}{\pi^2} \cdot \sin(\frac{\pi}{2} \cdot t) + \frac{1}{\pi} \cdot \sin(\pi t) - \frac{4}{9 \pi^2} \cdot \sin(\frac{3\pi}{2} \cdot t) - \frac{1}{2\pi} \cdot \sin(2\pi t)$$

## 6.2 SATZ VON DIRICHLET

$$S_{\infty}(t_0) = f(t_0) \quad \text{für alle } t_0, \text{ bei denen } f \text{ stetig ist}$$

$$S_{\infty}(t_0) = \frac{1}{2} \left( \lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t) + \lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t) \right)$$

für alle Sprungstellen  $t_0$   
von  $f$

## 6.3 AMPLITUDEN-PHASEN-FORM

$$A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (A_k \cos(k\omega_1 t - \varphi_k))$$

Wenn  $x$  von  $\sin(x)$  und  $\cos(x)$  übereinstimmen

1.  $A$  bestimmen

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \cos(2t) + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sin(2t)$$

$$A = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

2.  $\varphi$  bestimmen

$$\begin{aligned} a &= A \cdot \cos(\varphi) \\ b &= A \cdot \sin(\varphi) \end{aligned} \quad (FS) \quad \left| \begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \cdot \cos(\varphi) \rightarrow \cos(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \cdot \sin(\varphi) \rightarrow \sin(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right. \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

3. Zusammenfügen

$$\underline{\underline{f(t) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \cdot \cos(2t - \frac{\pi}{4})}}$$

Wenn  $x$  von  $\sin(x)$  und  $\cos(x)$  nicht übereinstimmen

1.  $A_k$  bestimmen

$$4 \cdot \sin(3t) - \cos(2t)$$

$$A_1 = \sqrt{0^2 + 4^2} = 4$$

$$A_2 = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1$$

2.  $\varphi_k$  bestimmen

$$\begin{array}{l} a_1 = A_1 \cdot \cos(\varphi_1) \\ b_1 = A_1 \cdot \sin(\varphi_1) \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} 0 = 4 \cdot \cos(\varphi_1) \\ 4 = 4 \cdot \sin(\varphi_1) \end{array} \right| \quad \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{array}{l} a_2 = A_2 \cdot \cos(\varphi_2) \\ b_2 = A_2 \cdot \sin(\varphi_2) \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} -1 = 1 \cdot \cos(\varphi_2) \\ 0 = 1 \cdot \sin(\varphi_2) \end{array} \right| \quad \varphi_2 = \pi$$

3. Zusammenfügen

$$\underline{\underline{f(t) = 4 \cdot \cos(3t - \frac{\pi}{2}) + \cos(7t - \pi)}}$$

Das Ganze kann analog auch mit  $\sin()$  statt  $\cos()$  gemacht werden, dann wäre es

$$A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \sin(k \cdot \omega_1 \cdot t + \delta_k)$$